

Potatis forts. (ej färskpotatis)

| <u>Preparat</u> | <u>Dos per ha</u> | <u>Bladmögelbehandling</u> | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | | <u>Intervall</u> | <u>Karenstid</u> | <u>Funktion</u> |
| Banjo Forte | 1,0 lit | 7 dagar | 7 dagar | Lok.sys+Kontakt |
| Cymbal* | 0,25 kg | 5-7 dagar | 7 dagar | Lok.sys |
| Infinito | 1,6 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | System+translaminär |
| Proxanil** | 2,0-2,5 lit | 7 dagar | 14 dagar | System+translaminär |
| Ranman Top | 0,5 lit | 5-7 dagar | 7 dagar | Kontakt |
| Revus / Revus Top | 0,6 lit | 7-10 dagar | 3 dagar | Lok.sys+Kontakt |
| Shirlan | 0,4 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | Kontakt |
| Zorvec Endavia | 0,4 lit | 7-10 dagar | 7 dagar | System+translaminär |

*) Cymbal skall alltid blandas med ett kontaktverkande preparat.
 **) För bästa effekt bör Proxanil blandas med Ranman Top

Intervall och preparatval styrs av väderlek och tillväxthastighet. I vissa fall kan kortare intervall krävas för att erhålla god effekt. Starta behandlingsprogrammet tidigt och utför all behandling på torr blast. Beakta karenstiderna i slutet av säsongen.

| <u>Preparat</u> | <u>Dos per ha</u> | <u>Alternariabehandling</u> | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| | | <u>Normal behandl.period</u> | <u>Karenstid</u> |
| Revus Top | Max 3 X 0,6 lit | Slutet Juni – t o m Aug | 3 dagar |
| Amistar | Max 2 X 0,5 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 14 dagar |
| Signum | Max 4 X 0,25 kg | Mitten Juli – t.o.m Aug | 3 dagar |
| Narita | Max 3 X 0,4 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 14 dagar |
| Propulse | Max 2 X 0,45 lit | Mitten Juli – t.o.m Aug | 21 dagar |

| Insekter: | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Stritar, stinkfly mfl | 0,2 lit Mavrik | Max 2 behandlingar |
| | eller 150-250 gr Mospilan | Max 1 behandling |
| Bladlöss | 160 gr Teppeki | Max 2 behandlingar |
| | eller 0,2 lit Mavrik | Max 2 behandlingar Endast kontaktverkan |

| Blastdödning: | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Avmognande blast alt blastkrossning | 1,0 lit Spotlight Plus | 2-3 dag efter ev blastkrossning | Morgon/förmiddag (7 dag karens) |
| OBS Spotlight Plus får endast användas en gång per år – antingen mot ogräs eller blastdödning | | | |

| Växtnäringsbrist: | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Manganbrist | 1,5-2,0 lit Mn 235 | Upprepas vid behov |
| Borbrist | 2,0-3,0 lit Bor 150 | |
| Magnesium/Fosforbrist | 5,0-6,0 lit Magnofoss | Upprepas vid behov |
| Allmän näringsbrist | 3,0-4,0 lit MicroTop | Upprepas vid behov |