

Veckorapport - Alnarp vecka 39, bladlöss i sugfällorna och rapsjordloppa 2021

Höstsmitta av rödsotvirus

För att kunna bedöma behovet av eventuell bekämpning och optimal tidpunkt för bekämpning på hösten är förekomsten av bladlöss avgörande. Sugfällorna ger ett bra mått på när stor inflygning sker och detta bör sedan kompletteras med att kontrollera enskilda fält. Det har varit en viss inflygning av löss i sugfällan på Alnarp den senaste veckan, men ännu på låg nivå, se tabellerna nedan. Det är dock ännu för tidigt att göra en behandling.

Tabell 1. Totalt antal havre-, sädes- och majsbladlöss/vecka fångade i sugfällan.

Källa: R. Sigvald, SLU.

ALNARP						
Vecka	2006*	2014	2018	2019	2020	2021
35	5	2	0	16	1	
36	1	6	7	14	27	
37	21	56	5	10	4	156
38	292	194	37	4	69	310
39	1510	186	33	245	233	
40	1765	533	124	145	631	
41	733	358	1916	110	117 ^{a)}	
42	1215	545	931	258	112	
43	636	310	198	14	20	
44	45	56	72	102	77	
45	45	60	126	26	42	
46	60	14	90	1	22	
47	50	10	7	5	20	
48	46		3	0	1	

INGELSTORP (Kalmar)						
Vecka	2006*	2014	2018	2019	2020	2021
35	3	2	0	4	3	3
36	7	6	4	7	43	75
37	6	81	23	49	8	97
38	11	54	125	7	87	9
39	372	508	88	76	829	
40	1340	389	463	461	316	
41	823	1059	2845	95	80	
42	795	660	925	288	216	
43	902	82	81	249	61	
44	120	33	42	21	28	
45		29	90	18	12 ^{a)}	
46		18	121	12	11 ^{c)}	
47		2	17	3	6	
48					0	

Veckorna 35 och 36 finns ingen data från Alnarp eftersom det var stopp i sugfällan.

Källa: Jordbruksverkets Växtskyddscentral Alnarp, Anna Gerdtsen