

Veckorapport - Alnarp vecka 40, bladlöss i sugfällorna och rapsjordloppa 2021

Höstsmitta av rödsotvirus – kontrollera tidigt sådda fält men behandla inte för tidigt

För att kunna bedöma behovet av eventuell bekämpning och optimal tidpunkt för bekämpning på hösten är förekomsten av bladlöss avgörande. Sugfällorna ger ett bra mått på när stor inflygning sker och detta bör sedan kompletteras med att kontrollera enskilda fält. Dessutom är vädret under hösten, speciellt senhösten, av stor betydelse för hur länge bladlössen kan vara aktiva och förökas. De stora riskåren med mycket rödsotvirus har varit år med bladlöss i fälten i kombination med varmt i oktober OCH november.

Inflygningen av bladlöss till sugfällorna är fortsatt ganska måttlig, se tabellerna nedan.

Det finns ingen bekämpningströskel för bladlus på hösten i höstsåden. Risken för angrepp är störst i tidigt sådda fält. Bekämpning kan vara motiverad när grödan har minst 3-4 blad och där det är lätt att hitta bladlöss på plantorna, ca 2-3% angripna plantor.

Bladlöss i fält kan lättast ses om man lägger sig på marken och tittar på plantorna i motljus. Bladlössen kan sitta på bladen och strået och även ända nere vid markytan. Det är viktigt att följa den fortsatta utvecklingen för att bedöma eventuellt bekämpningsbehov framöver.

Tabell 1. Totalt antal havre-, sädes- och majsbladlöss/vecka fångade i sugfällan.

Källa: R. Sigvald, SLU.

ALNARP						
Vecka	2006*	2014	2018	2019	2020	2021
35	5	2	0	16	1	
36	1	6	7	14	27	
37	21	56	5	10	4	156
38	292	194	37	4	69	310
39	1510	186	33	245	233	279
40	1765	533	124	145	631	
41	733	358	1916	110	117 ^{a)}	
42	1215	545	931	258	112	
43	636	310	198	14	20	
44	45	56	72	102	77	
45	45	60	126	26	42	
46	60	14	90	1	22	
47	50	10	7	5	20	
48	46		3	0	1	

INGELSTORP (Kalmar)						
Vecka	2006*	2014	2018	2019	2020	2021
35	3	2	0	4	3	3
36	7	6	4	7	43	75
37	6	81	23	49	8	97
38	11	54	125	7	87	9
39	372	508	88	76	829	152
40	1340	389	463	461	316	
41	823	1059	2845	95	80	
42	795	660	925	288	216	
43	902	82	81	249	61	
44	120	33	42	21	28	
45		29	90	18	12 ^{a)}	
46		18	121	12	11 ^{c)}	
47		2	17	3	6	
48					0	

Veckorna 35 och 36 finns ingen data från Alnarp eftersom det var stopp i sugfällan.

Källa: Jordbruksverkets Växtskyddscentral Alnarp, Anna Gerdtsen