

Ärter

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs			
Örtogräs	0,9 lit Fenix + 0,25 lit Centium	Från sådd fram till 5 dag före uppkomst	Markfukt gynnar effekten Välta före behandlingen
Örtogräs	eller 0,35 lit Fenix + 0,6 kg Basagran SG	Till och med stadie 30	
	eller 1-1,25 lit Corum + 1-1,25 lit Dash	Stadie 12-19	Minst 60 dagar före sådd av höstraps
	eller 0,625 lit Corum + 0,625 lit Dash	Stadie 12-14	
	följt av 0,625 lit Corum + 0,625 lit Dash	Stadie 16-19	Intervall min 7 dag Minst 60 dagar före sådd av höstraps
Flyghavre mfl gräs- ogräs	1,0-1,5 lit Agil eller	Före stadie 59	Höga dosen om kvickrot Flyghavren 3-5 blad Intervall till annan ogräsbehandling >7 dag
Som ovan + gröe	0,6-1,0 lit Select Plus	Stadie 12-39	Se ovan - dock endast torkade ärtor (ej konservärt)
OBS Vid odling av konservärt – följ respektive företags odlingsanvisning och preparatval!			

Insekter			
Ärtvivel, Ärtvecklare (bladlöss)	0,2 lit Mavrik eller 0,06 lit Nexide CS	Stadie 31-69 Stadie 10-69	Ej bifarligt Bifarligt
Bladlöss	140 gr Teppeki + 0,25 lit Renol	Stadie 11-71	
	eller 0,2 lit Mavrik	Stadie 31-69	

Svamp			
Bomullsmögel, gråmögel mfl.	0,5-0,7 kg Signum eller 0,6 lit Amistar eller 0,4 lit Elatus Era	Stadie 61-65	Hög vattenmängd vid samtliga alternativ

Växtnäringsbrist:			
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn	Innan blomningen	
Borbrist	2,0-3,0 lit Bor 150		