

Vårsäd med insådd

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Gräsinsådd	<p>Se vårsäd utan insådd men max 0,6 lit MCPA*</p> <p>Använd inte Atlantis/ Attribut/ CDQ/ Event/ Rexade 440/ Broadway Axial eller Hussar Plus</p>	Insådden minst 2 blad	Använd ej CDQ/Gratil/ Axial/Trimmer eller gräsogräspräparat i gräsfröodlingar
Rödklöverinsådd	<p>10-15 gr Gratil + 0,6 lit MCPA* eller 7,5-11,25gr Trimmer + 0,5 lit MCPA*</p>	<p>1-2 treväpplingar</p> <p>1-2 treväpplingar</p>	<p>Använd ej Gratil i fröodlingar</p> <p>Använd ej Trimmer i fröodlingar</p>
Vitklöver och Luserninsådd	<p>1,15 kg Basagran SG + 0,3-0,5 lit Renol eller 15 gr Gratil + 0,5 lit Renol</p>	<p>Spadblad/treväppling</p> <p>1-2 treväpplingar</p>	Använd ej Gratil i fröodlingar

*= Behandlingstidpunkt med MCPA är tillåtet i spannmålens stadie 23-31