

Fodermajs

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Örtogräs	0,5-0,75 lit Callisto ¹ följt av 0,5-0,75 lit Callisto ¹	Från stadie 11 Ogräsen hjärtblad Senast stadie 18 10-12 dagar efter första behandlingen	Växtföljdsrestriktioner se nedan
<u>Kan kompletteras med:</u>			
Hirs, näva, molke mfl örtogräs	0,5 lit Onyx	Stadie 12-16	Kan upprepas
Näva mfl örtogräs	11,25 gr Harmony + 0,1 lit vätmedel följt av 7,5 gr Harmony + 0,1 lit vätmedel	Från stadie 12 Senast stadie 16	
Åkerbinda mfl örtogräs	0,15 lit Starane 333	Stadie 13-16	
Div gräsogräs	50 gr MaizTer+ 0,67 lit MaizOil följt av 50 - 100 gr MaizTer+ 0,67-1,33 lit MaizOil	Från stadie 12 Senast stadie 18	Kan upprepas

- **1) Totalt max 1,5 lit Callisto / ha vart annat år eller max 1,0 lit Callisto varje år (Regnr 5854)**
- **Efter Callisto kan höst eller vårspannmål odlas. Innan våroljeväxter krävs plöjning. Sockerbetor, ärter, bönor eller grönsaker kan inte odlas efterföljande vår.**

Svamp			
Ögonfläck, Bladfläck	0,8-1,0 Comet Pro eller 0,8-1,0 lit Propulse	Stadie 30-65 Stadie 33-69	Majs ca 100-120 cm Max 0,5 lit före stadie 40

Växtnäringsbrist:	
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn
Borbrist	2,0-3,0 lit Bor 150
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop