

Vårkorn

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs:			
Åkerven, flyghavre	1,0 lit Event Super + 0,5 lit Renol	Tom stadie 30 (12 dagars intervall till fenoxisyra)	Kan blandas med Gratil/ Trimmer.
som ovan + hönshirs	eller 0,8-1,2 lit Axial	Stadie 22-39	Höga dosen renkavle Hönshirs gror sent
Åkerven, örtogräs	70 ml Hussar Plus ¹ + 0,5 lit Renol	Tom stadie 30	Temp >8°C
Örtogräs(bred effekt)	7,5-11,25gr Trimmer +0,75 lit Primus XL + 0,1 lit Vätmedel	Tom stadie 39	Kan blandas med 0,1 lit Legacy ² (tom st 31) (förstärkt viol/veronika- effekt)
	eller 2,0-2,5 lit Ariane S	Tom stadie 31	Temp >12°C
	eller 0,25-0,35 lit Pixxaro	Stadie 20-45	Max 0,25 lit ≤ stadie 29
Tistel	25 gr CDQ + 1 lit MCPA + 0,1 lit Vätmedel	Tom stadie 39	Ej insådd Växtföljdsrestriktioner !!

Not 1: Efter torr sommar rekommenderas jordbearbetning före sådd av höstraps

Not 2: Efter våranvändning av Legacy krävs jordbearbetning före sådd av höstraps

Svamp:			
Mjöldagg	0,12-0,25 lit Talius eller 0,35-0,5 lit Leander	Talium har 6-8 veckors effekt	Generellt gäller: *Behandla tidigt på begynnande angrepp *Dos beroende på angreppsgrad och önskad effektid *Låga doser kan behöva upprepas *Vid etablerat angrepp av mjöldagg tillsatt Leander
Bladfläcksjuka, sköld- fläcksjuka, mjöldagg, rost mfl	0,5-0,75 lit Elatus Era	Stadie 31-59	
	eller 0,6-0,75 lit Ascra Xpro + 0,2 lit Comet Pro	Stadie 30-61	
Axfusarios	0,6 lit Proline	Stadie 65	45 dagar karens

Tillväxtreglering:

Ax / strånbrytning	0,2-0,35 lit Cerone	Stadie 32-49
--------------------	---------------------	--------------

Insekter:

Trips, sädesbladbagge löss, mfl	0,2 lit Mavrik eller 0,05 lit Nexide CS		
Bladlöss	140 gr Teppeki + 0,25 lit Renol	Stadie 21-77	Max 1 behandling

Växtnäringsbrist:

Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn
Kopparbrist	0,5 lit Norotec Koppar
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop