

Råg/Rågvete - vår

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs:			
Veronika/viol	0,15-0,2 lit Legacy ²	Tidigt vid tillväxt start	Om ej höstbehandlat
Åkerven, flyghavre, hönshirs	0,8 lit Axial	Stadie 22-39	Hönshirs gror sent
Åkerven, vitgröe renkavle	0,45-0,9 lit Atlantis OD ¹ (Max 0,45 lit i Råg) + 0,5 lit Renol	Rågvete: St 20-32 Råg: Stadie 20-30	Kan blandas med Hussar Plus för bredare effekt
Åkerven, flyghavre samt örtogräs	1,1-1,65 lit Avoxa eller 110-220 gr Broadway ¹ + 0,5 lit PG26N eller 40-50 gr Rexade 440 ¹ + 0,5 lit PG26N	Stadie 22-32 Stadie 21-39 Stadie 30-32	Hög dos om sandlosta, renkavle eller kvickrot Jordtemp >6°C Flyghavre 3-4 blad. Jordtemp >2°C Flyghavre 3-4 blad.
Örtogräs(bred effekt)	11,25-15 gr Express 50SX + 0,75-1,0 lit Primus XL + 0,1 lit Vätmedel	Stadie 30-39	Kan blandas max 0,2 lit Legacy ² tom stadie 31 (förstärkt viol/ veronika-effekt)
Snärjmåra	0,75-1,0 lit Primus XL	Stadie 30-39	Temp >5°C
Tistel	25 gr CDQ + 1 lit Metaxon 750 + 0,1 lit vätmedel	Stadie 30-39	Ej insådd Växtföljdsrestriktioner !!!

Not 1: Efter torr sommar rekommenderas jordbearbetning före sådd av höstraps

Not 2: Efter våranvändning av Legacy krävs jordbearbetning före sådd av höstraps

Tillväxtreglering:	0,75-1,5 lit Stablan	Stadie 30-32	Max 1,0 lit Stablan i rågvete stadie 30-31
	och/eller 0,4-0,7 lit Moddus M	Stadie 31-39	>8°C vid behandlingen (Rågvete max 0,6 lit/ha)
	och/eller 0,5-0,75 lit Cerone	Stadie 39-49	

Svamp:			Generellt gäller:
Mjöldagg	0,35-0,5 lit Leander	Stadie 30-65	* Behandla tidigt på begynnande angrepp
Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, mjöldagg, rost mfl	0,3-0,5 lit Prosaro EC250 eller 0,5-0,7 lit Elatus Era eller 0,6-0,75 lit Ascra Xpro eller 0,75-1,25 lit Avastel	Stadie 30-69 Stadie 31-69 Stadie 30-61 Stadie 30-69	* Dos beroende på angreppsgrad och * Låga doser kan behöva upprepas * Vid etablerade angrepp av mjöldagg tillsätt Leander

Insekter:			
Trips, sädesbladbaggar löss, mfl	0,2 lit Mavrik eller 0,05 lit Nexide CS	Stadie 10-75 Stadie 12-75	Max 2 beh på våren Max 1 beh per säsong
Bladlöss	100-140 gr Teppeki	Stadie 21-77	Max 2 beh

Växtnäringsbrist:			
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn		
Kopparbrist	0,5 lit Norotec Koppar		
Allmän näringsbrist	3-4 lit MicroTop		