

Sockerbetor

Ogräs före sådd: 3-4 lit Jablo Plus alt 1,5-2,0 kg Roundup Power Max

Ev mellan sådd och uppkomst: 0,075-0,12 lit Centium CS (spec om åkerbinda, trampört, snärjmåra)
(låg dos på lätt jord – undvik dubbelbehandlingar)

Efter uppkomst (örtogräs hjärtblad):

	Behandling 1	Behandling 2	Behandling 3
Goltix SC/Gold (3 lit tot)	1,5-1,0 lit	0,75-1,0 lit	0,75-1,0 lit
Betanal	1,0-2,0 lit	1,0-2,0 lit	1,0-2,0 lit
Tramat SC	0,05-0,14 lit	0,14 lit	0,14 lit
Renol	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit
Norotec Mangan		0,5 lit	0,5 lit

Efter uppkomst (örtogräs hjärtblad) spec baldersbrå, näva, snärjmåra:

	Behandling 1	Behandling 2	Behandling 3
Goltix SC/Gold (3 lit tot)	1,5-1,0 lit	0,75-1,0 lit	0,75-1,0 lit
Tanaris	0,15-0,3 lit	0,3-0,6 lit	0,3-0,6 lit
Betanal	1,0-2,0 lit	1,0-2,0 lit	1,0-2,0 lit
Tramat SC	0,05-0,14 lit	0,14 lit	0,14 lit
Renol	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit
Norotec Mangan		0,5 lit	0,5 lit

- Behandla ej då betorna är skadade/påverkade av tex insekter, vind, frost, hög temp mm
- Trammat får endast användas med 1 X 0,45 lit/ha eller 2 X 0,25 lit/ha eller 3 X 0,14 lit/ha
- Reducera Trammat-dosen om hög temp eller blandning med Centium
- Max totaldos 0,2 lit Centium /ha
- Efter uppkomst får Cenitum används tidigast när betorna har 2 fullt utvecklade örtblad (st 12)
- Markfukt gynnar effekten av Tanaris. Vid hög markfuktighet och/eller lätt jord kan höga doser Tanaris ge betpåverkan.
- LÄS ALLTID ETIKETTERNA innan behandling!!

Kvickrot mfl gräsogräs	1,0-1,5 lit Agil eller	< stadie 32	Kvickroten 3-4 blad
Som ovan + vitgröe	1,5-2,0 lit Select Plus	Stadie 12-33	
Tistel	139 gr Matrigon72SG + 0,5 lit Renol	Stadie 12-19 Tistel 15-20 cm	Värme gynnar effekt Restr. nästa gröda

Insekter			
Trips	0,2 lit Mavrik	Stadie 11-14	UPMA mot trips
Betfluga, betbladlus	0,2 lit Mavrik	Stadie 09-39	Max 2 behandlingar
Bladlöss	140 gr Teppeki		Max 1 behandling

Svamp			
Mjöldagg, Ramularia och Rost	0,6 lit Comet Pro eller 0,3 lit Comet Pro + 0,75 lit Revyona	Stadie 34-49	Vid beg angrepp Upprepas vid behov Max 2 beh / år

Växtnäringsbrist:			
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn	1-2 behandlingar	1:a vid 4-6 blad 2:a vid 8-10 blad
Borbrist	2,0-3,0 lit Bor 150	4-8 bladsstadiet	Ej blandbar med Mavrik
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop		