

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs:			
Åkerven, flyghavre	1,0 lit Event Super + 0,5 lit Renol	Tom stadie 13-30 (12 dagars intervall till fenoxisyra)	Kan blandas med Gratil/ Express 50SX
som ovan + hönshirs	eller 0,8-1,2 lit Axial	Stadie 22-39	Höga dosen renkavle Hönshirs gror sent
Åkerven, örtogräs	70 ml Hussar Plus ¹ + 0,5 lit Renol	Stadie 20-32	Temp >8°C
Örtogräs(bred effekt)	7,5-11gr Express 50SX +0,75 lit Primus XL + 0,1 lit Vätmedel	Stadie 20-39	Kan blandas med 0,1 lit Legacy ² (tom st 31) (förstärkt viol/veronika- effekt)
	eller 2,0-2,5 lit Ariane S	Stadie 21-31 Temp >12°C	Restriktioner halm / efterföljande gröda
	eller 0,25-0,35 lit Pixxaro	Stadie 20-45	Max 0,25 lit ≤ stadie 29
Tistel	18 gr CDQ + 1 lit Metaxon 750 + 0,1 lit Vätmedel	Stadie 30-39	Ej insådd Växtföljdsrestriktioner !!

Not 1: Efter torr sommar rekommenderas jordbearbetning före sådd av höstraps

Not 2: Efter våranvändning av Legacy krävs jordbearbetning före sådd av höstraps

Svamp:			Generellt gäller:
Mjöldagg	0,35-0,5 lit Leander	Stadie 30-65	*Behandla tidigt på begynnande angrepp
Bladfläcksjuka, sköld- fläcksjuka, mjöldagg, rost mfl	0,5-0,75 lit Elatus Era eller 0,75-1,25 lit Avastel eller 0,6-0,75 lit Ascra Xpro + 0,2 lit Comet Pro	Stadie 31-59 Stadie 30-65 Stadie 30-61	*Dos beroende på angreppsgrad och önskad effektid *Låga doser kan behöva upprepas *Vid etablerat angrepp av mjöldagg tillsatt Leander
Axfusarios	0,5 lit Patel 300 EC	Stadie 65	45 dagar karens

Tillväxtreglering:

Ax / strånbrytning	0,2-0,35 lit Cerone	Stadie 32-49
--------------------	---------------------	--------------

Insekter:

Trips, sädesbladbagge löss, mfl	0,2 lit Mavrik eller 0,05 lit Nexide CS	Stadie 10-75 Stadie 12-75	Max 2 beh Max 1 beh per säsong
Bladlöss	140 gr Teppeki + 0,25 lit Renol	Stadie 21-77	Max 1 behandling

Växtnäringsbrist:

Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn
Kopparbrist	0,5 lit Norotec Koppar
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop