

Höstoljeväxter (vår)

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
Ogräs (våren)			
Bred örtogräseffekt	1,0 lit Korvette	Stadie 30-50 (ej synbara knoppar)	Temp ≥ 8-9°C Ej frost dygnen före/ efter behandlingen
Baldersbrå, blåklint, tistel, gråbo, snärjmåra	0,3 lit Galera ¹⁾ + 0,3 lit PG26N	Stadie 30-50 (ej synbara knoppar)	Temp ≥ 8-9°C Ej frost dygnen före/ efter behandlingen
Baldersbrå, blåklint tistel, gråbo	165 gr Matrigon 72SG ¹⁾ + 0,5 lit Renol	Stadie 30-50	Värme (>15°C) gynnar effekten
Kvickrot mfl gräsogräs	1,5 lit Agil	< stadie 50	Kvickroten 3-5 blad
	eller 1,0 lit Select Plus	Stadie 12-50	Max 1 beh per år
¹⁾ Restriktioner halm / efterföljande gröda			

Insekter			
Rapsbaggar mfl insekter	150-200 gr Mospilan*	Stadie 50-80	Ej bifarligt - Max 1 beh
(Upprepas vid behov alternera mellan produkterna)	eller 0,2 lit Mavrik	Stadie 30-71	Ej bifarligt - Max 2 beh i stadie 30-71
	eller 0,06 lit Nexide CS	Stadie 10-69	Bifarligt - Max 1 beh
	*) använd denna produkt då pyretroidresistenta insekter förekommer		

Svamp			
Bomullsmögel, grå-mögel, svartfläcksjuka	1,0 lit Avastel	Från beg till full blom	Hög vattenmängd (samtliga alternativ)
	eller 0,5-0,7 lit Pictor Active	Från beg till full blom	
	eller 1,0 lit Maxentis	Från beg till full blom	

Nedvissning	3,0 lit Jablo Plus + 0,5 lit Vätmedel	2-3 veckor före skörd	Minst 200 lit/ha
	eller 1,5 kg Roundup Power Max	2-3 veckor före skörd	Minst 200 lit/ha

Växtnäringsbrist:			
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn		
Svavelbrist	5-6 kg Svavelnäring		
Borbrist	2-3 lit Bor 150		Ej blandbar med Mavrik
Allmän brist	2-4 lit YaraVita Canola Bio		Ej blandbar med Mavrik